

DISPOGEL

nawilżający żel do cewnikowania z lidokainą HCL 2%

WYTWÓRCA:	Dispofarma, Turcja				
IMPORTER:	Lubmedical Sp. z o. o. Sp. k., Lublin				
ZASTOSOWANIE:	- Wprowadzany do cewki moczowej przed wykonaniem procedury cewnikowania pęcherza moczowego (również śródoperacyjnie) - Wymiana wszelkiego rodzaju cewników - Zabiegi endoskopowe, rektoskopia, kolonoskopia				
WŁAŚCIWOŚCI:	- Pozwala uzyskać kompletne znieczulenie błony śluzowej ułatwiając wprowadzenie cewników lub instrumentów medycznych – w składzie żelu Lignocaine Hydrochloride 2%. - Minimalizuje ryzyko zakażeń jatrogennych dzięki zawartości środków bakteriobójczych i bakteriostatycznych o szerokim spektrum działania – w składzie Chlorhexidine Digluconate 0,05% - Dostępny w dwóch pojemnościach, w wygodnych do aplikacji, ampułkostrzykawkach - Dawki przystosowane do warunków anatomicznych - 6 ml dla dzieci i kobiet oraz 11 ml dla mężczyzn - Łatwy i wygodny sposób aplikacji - Wysoki stopień przejrzystości preparatu gwarantuje brak zanieczyszczeń powierzchni optycznej endoskopów - Jednorazowego użytku - Sterylny, sterylizowany promieniami gamma - Bez zawartości lateksu - Opakowanie jednostkowe typu: papier/folia				
ROZMIAR I KOD:	KOD	POJEMNOŚĆ/GRUPA DOCELOWA	TYP OPAKOWANIA	OPAKOWANIE HANDLOWE	OPAKOWANIE TRANSPORTOWE
	DSP-2	6 ml / dzieci i kobiety	papier/folia	50 sztuk*	4 x 50 sztuk
	DSP-3	11 ml / mężczyźni	papier/folia	25 sztuk	8 x 25 sztuk
OPRACOWANO NA PODSTAWIE:	materiałów marketingowych firmy: Lubmedical Sp. z o. o. Sp. k., Lublin				



*na życzenie klienta produkt pakowany po 25 sztuk